



Étude de cas soumise par:
Marijke Voskeuil, infirmière spécialisée
en chirurgie pédiatrique MSc, Emma
Kinderziekenhuis - Amsterdam UMC

***La patiente de cette étude de cas a été évaluée**

4 raisons de l'utiliser:

1. Reste en place plus longtemps, ce qui aide à prévenir les fuites^{1,2}
2. Moins de temps passé à changer la poche^{1,2}
3. Amélioration de la peau péristomiale^{1,2}
4. Amélioration de la qualité de vie^{1,2}

Antécédents de la patiente:

- Fillette de 8 ans
- Juin 2020 - Diagnostic de colite ulcéreuse
- Admissions multiples pour un traitement conservateur
- Janvier 2021 - Réalisation d'une colectomie et d'une iléostomie



Problèmes:

- Elle avait déjà essayé deux poches de marques concurrentes. Après 1 mois avec la poche B, la zone ombilicale s'est inflammée et a provoqué des démangeaisons extrêmes et des fuites
- Devait changer de poche environ 1 à 2 fois par jour
- Sentiment d'anxiété en raison des fuites continues de la poche



Résultats obtenus avec eakin dot® 1-pièce:

- L'infirmière stomathérapeute a conseillé l'essai d'eakin dot® 1-pièce vidable (Réf 840301)
- Les bords cannelés permettent de réduire la quantité d'hydrocolloïde recouvrant la zone ombilicale
- La peau péristomiale a cicatrisé et il n'y a plus de fuite de la poche
- Changement d'eakin dot® tous les 2-3 jours
- La patiente est beaucoup plus confiante. Avant l'utilisation d'eakin dot®, elle voulait changer de poche dès qu'elle pensait qu'il y avait une fuite, mais cette crainte a maintenant disparu



“Fantastique, on se sent bien avec, adhère bien et la peau reste saine”

Preuves cliniques en faveur d'eakin dot® 1-pièce plat:

- L'hydrocolloïde *skinsmart™* est cliniquement prouvé comme offrant une plus grande sécurité et une plus longue durée de port de la poche par rapport aux autres hydrocolloïdes disponibles²
- S'adapte bien aux plis de la peau péristomiale²