

# eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour gérer une peau péristomiale sensible.

## 4 raisons de l'utiliser :

1. Le choix d'un appareillage idéal est une étape importante de la guérison postopératoire.<sup>1</sup>
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.<sup>2</sup>
3. L'irritation péristomiale est une complication courante lors de la prise en charge d'une stomie.
4. Les problèmes de peau péristomiale peuvent être éliminés avec un appareillage adapté.<sup>3,4</sup>

## Etude de cas remise par :

Mirjam van Berkom

Infirmière stomathérapeute spécialisée dans le soin du colon

### Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

\*Skinsmart: respectueux de la peau

## Historique du patient :

- 2011 : Mr V.d.B. a subi le retrait d'un adénome villositaire par endoscopie.
- 2012 : retrait des tissus cicatriciels par colonoscopie.
- Septembre 2017 : Diagnostic d'un cancer colorectal.
- Octobre 2017 : Une iléostomie en canon de fusil est formée.
- L'apprentissage des soins est mis en place avec une poche 1-pièce vidable.



## Analyse de l'infirmière :

- Stomie saine.
- Peau péristomiale intacte.
- Utilise un 1-pièce modelable à cause d'une stomie de forme ovale et avec un œdème.
- Autonome dans le soin de sa stomie.
- Rentre chez lui avec la mise en place d'un suivi fait par des infirmières de soins à domicile.

## Problèmes :

- 2 semaines après l'opération, il souffre de fuites et sa peau est rouge et abîmée.

## L'infirmière recommande eakin dot® 2-pièces (et de la poudre) :

- Grâce à son hydrocolloïde *skinsmart*\* qui prolonge la durée de port.
- La forme et la taille du support protègent la peau péristomiale.

## Résultats :

- 5 jours plus tard, la peau péristomiale a guéri et l'utilisation de la poudre est arrêtée.
- Le support reste en place 2 à 3 jours et le changement de poche s'effectue aussi tous les 2 à 3 jours.

“Je ressens un sentiment de sécurité lors de la mise en place de la poche grâce au clique audible et la souplesse me permet de bouger sans aucune restriction.”

## Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces :

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*\* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE